

Reference 13

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 62-135472
 (43)Date of publication of application : 18.06.1987

(51)Int.Cl.

C07D413/14
 // A61K 31/535
 (C07D413/14
 C07D241:00
 C07D265:00)

(21)Application number : 60-276074
 (22)Date of filing : 10.12.1985

(71)Applicant : YAKULT HONSHA CO LTD
 (72)Inventor : HIKICHI MANABU
 YOKOKURA TERUO
 FURUTA TOMIO
 YAEHASHI TAKASHI

(54) NOVEL 1,2-BIS-3,5-DIOXOPIPERAZINYLETHANE DERIVATIVE


(57)Abstract:

NEW MATERIAL: The compound of formula I (R1 and R2 are H or lower alkyl; at least one of them is lower alkyl).

EXAMPLE: 1,2-Bis[N-(2-methylmorpholino)-methyl-3,5-dioxopiperazinyl]-ethane.

USE: It has activity to inhibit mitotic cell division and is effective in suppressing the formation of blood vessel at the circumference of tumor undergoing active cell proliferation. Accordingly, it can be used as an agent for preventing metastasis of cancer or as a carcinostatic agent.

PREPARATION: The compound of formula I can be produced by stirring the alkylmorpholino derivative of formula II, formalin and 1,2-bis(3,5-dioxopiperazinyl)-ethane of formula III in a mixed solvent containing dimethylformamide and ethanol, etc., under heating.



Ref. B

⑨ 日本国特許庁(J P)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報(A)

昭62-135472

⑫ Int. Cl.

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和62年(1987)6月18日

C 07 D 413/14
A 61 K 31/535
C 07 D 413/14
241:00
265:00

ADU

7431-4C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑭ 発明の名称 新規な1,2-ビス-3,5-ジオキソピペラジニルエタン誘導体

⑮ 特 願 昭60-276074

⑯ 出 願 昭60(1985)12月10日

⑰ 発 明 者 引 地 学 東京都港区東新橋1丁目1番19号 株式会社ヤクルト本社
⑱ 発 明 者 横 倉 輝 男 東京都港区東新橋1丁目1番19号 株式会社ヤクルト本社
⑲ 発 明 者 古 田 富 雄 東京都港区東新橋1丁目1番19号 株式会社ヤクルト本社
⑳ 発 明 者 八 重 樫 隆 東京都港区東新橋1丁目1番19号 株式会社ヤクルト本社
㉑ 出 願 人 株式会社ヤクルト本社
㉒ 代 理 人 弁理士 南 孝 夫 東京都港区東新橋1丁目1番19号


明 細 書

1 発明の名称

新規な1,2-ビス-3,5-ジオキソピペラジニルエタン誘導体

2 特許請求の範囲

1 一般式



(式中 R₁ および R₂ は、それぞれ水素原子又は低級アルキル基を従わす。ただし、R₁ および R₂ のうちの少くとも一方は低級アルキル基である)

で示される1,2-ビス-3,5-ジオキソピペラジニルエタン誘導体。

2 R₁、R₂ がそれぞれ水素原子、メチル基およびエチル基からなる群から選ばれる(ただし、R₁ と R₂ がともに水素である場合を除く)特許請求の範囲第1項記載の1,2-ビス-3,5-

-ジオキソピペラジニルエタン誘導体。


3 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕


本発明は抗腫瘍活性を有する新規な1,2-ビス-3,5-ジオキソピペラジニルエタン誘導体に関する。

〔従来技術〕

1970年、タレイトンは、下記式Ⅰで表わされる1,2-ビス(3,5-ジオキソピペラジニル)エタン



の抗腫瘍活性を報告した。その後、より活性が高くより低毒性であるこの種の誘導体を求めて研究が行われた結果、1980年に下記式Ⅱで表わされるジオキソピペラジン化合物が上海薬物研究所で開発された。



ビス〔N-モルホリノメタル-1,2-ビス(3,5-ジオキソピペラジニル)〕エタン(以下ビモランと記す)。ビモランは広範な抗腫瘍スペクトラムを示し、かつ低毒性で高い治療効果をもつといわれている。


従来知られているこれらのビスジオキソピペラジニル誘導体は非特異的なプロテイナーゼの阻害剤で、抗有糸分裂阻害作用を有し、癌周囲の血管形成を阻止することから癌細胞の転移を抑制すると報告されているが、毒性、抗腫瘍活性の点でいまだ満足すべきものではない。

〔問題点を解決するための手段〕

そこで、本発明者らはこのビモランの化学構造を基本として種々の誘導体を合成し、抗腫瘍活性および毒性を比較したところ、ビモランのモルホリン環に低級アルキル基を導入された構造を有する物質がビモランに比べて、その抗腫瘍活性および毒性においてすぐれたものであることを見出し、本発明を完成するに至つた。

本発明に係る化合物は、次の一般式

ジニル) - エタンとをジメタルホルムアミドおよびエタノールなどを用いた混合溶液中で加熱攪拌する。この場合の反応式を示すと以下のとおりである。




〔実施例、試験例〕

実施例 1

1,2-ビス〔N-(2-メタルモルホリノ)-メタル-3,5-ジオキソピペラジニル〕-エタン

ジメタルホルムアミド4.46gに1,2-ビス-(3,5-ジオキソピペラジニル)-エタン3.77gとホルマリン7.44mlを懸濁し、これに、2-メタルモルホリン6.77gを攪拌しながら少しずつ加えた。油浴(浴温85℃)で2時間加熱攪



(式中R₁、R₂はそれぞれ水素原子または低級アルキル基を表わす。ただし、R₁およびR₂のうちのいずれか一方は低級アルキル基である)で示されるビモランの誘導体である。

本発明に係る化合物は、抗有糸分裂阻害作用を有し、細胞増殖が活発な腫瘍周辺の血管形成を阻止することにより、癌の転移防止剤あるいは制癌剤として使用することができる。

本発明に係る化合物は次の方法により製造することができる。

一般式 II



(式中、R₁およびR₂は前述の定義を有する)で示されるアルキルモルホリノ誘導体とホルマリンおよび1,2-ビス(3,5-ジオキソピペラ

ジニル) - エタンとを混合溶液は淡褐色の透明な溶液になった。減圧にて過剰の反応試薬及びジメタルホルムアミドを留去し、そのまま、一夜放置し、生じた白色結晶をエタノール100ml、アセトン200mlで洗い減圧乾燥すると標記化合物が白色結晶(3.87g)として得られた。

融点 158.0℃

元素分析 (C₂₂H₅₆N₄O₆)

計算値 C 54.98 H 7.55 N 17.49

実測値 C 54.50 H 7.22 N 17.91

IR(ν_{cm}⁻¹) 2960, 2850, 1735, 1690, 1500,

1160

実施例 2

1,2-ビス〔N-(2,6-ジメタルモルホリノ)-メタル-3,5-ジオキソピペラジニル〕-エタン

ジメタルホルムアミド100mlとエタノール30mlの混合液に1,2-ビス(3,5-ジオキソピペラジニル)-エタン5.08gとホルマリン7.44mlを懸濁し、これに、2,6-ジメタルモルホリ

2.12gを攪拌しながら少しずつ加えた。加え終わったのち引き抜き、油浴(浴温80℃)にて2時間加熱攪拌し、次いで、未反応の結晶を減圧ろ過で除去、母液を減圧蒸留に付し、過剰の反応試薬エタノールおよびジメチルホルムアミドを除いた。一夜、放置後、生じた結晶をエタノール200ml、洗いでアセトン300mlで充分に洗い、減圧乾燥すると標記化合物が白色結晶(73.9g)として得られた。

融点 168.0℃

元素分析 (C₂₄H₄₀N₆O₆)

計算値 C:56.67 H:7.97 N:16.53

実測値 C:56.90 H:7.84 N:16.24

IR(ν_{max}⁻¹) 2975, 2870, 1735, 1690, 1500,

1160

実施例 3

1,2-ビス[N-(2-エチルモルホリン)-メチル-3,5-ジオキソビペラジニル]-エタンジメチルホルムアミド50mlとエタノール15mlの混合液に、1,2-ビス(3,5-ジオキソビ

ジメチルホルムアミド165mlとエタノール20mlの混合液に1,2-ビス(3,5-ジオキソビペラジニル)-エタン4.19gとホルマリン10mlを懸濁し、これに、攪拌下に、2,6-ジエチルモルホリン2.16gを少しずつ加えた。加え終わったのち、引き抜き、油浴(浴温80℃)にて2時間加熱攪拌した。得られた淡褐色透明の反応混合液をろ過し、母液を減圧蒸留に付し、過剰の反応試薬、エタノールおよびジメチルホルムアミドを除去した。蒸留残渣を一夜放置すると結晶を生じた。この結晶をろ取したのち、少量のエタノールおよびアセトンで充分に洗い、減圧乾燥すると標記の化合物が白色結晶として0.96g得られた。さらに、母液を一夜放置すると白色結晶を生じるので、これをろ取し、少量のアセトンで洗い、4.87gの結晶を得た。

融点 132.0~140.5℃

元素分析 (C₂₈H₄₈N₆O₆)

計算値 C:59.55 H:8.57 N:14.88

実測値 C:59.83 H:8.57 N:14.90

ペラジニル)-エタン254gとホルマリン5mlを懸濁し、これに、2-エチルモルホリン3.46gを攪拌しながら少しずつ加えた。加え終わったのち、たぐちに油浴(浴温70℃)にて加熱攪拌し2時間後、未反応の結晶を減圧に除いた。得られた淡褐色溶液を減圧に付し、過剰の溶媒等を除き一夜放置すると結晶を生じた。この結晶をエタノール100mlとアセトン200mlで充分に洗い、減圧乾燥すると標記の化合物が白色結晶(12.7g)として得られた。

融点 166.5℃

元素分析 (C₂₄H₄₀N₆O₆)

計算値 C:56.67 H:7.93 N:16.53

実測値 C:56.47 H:7.63 N:16.79

IR(ν_{max}⁻¹) 2975, 2825, 1730, 1690, 1500,

1125

実施例 4

1,2-ビス-[N-(2,6-ジエチルモルホリン)-メチル-3,5-ジオキソビペラジニル]-エタン

IR(ν_{max}⁻¹) 2960, 2825, 1720, 1660, 1500, 1160, 1120

試験例

8-180系固型癌に対する抗腫瘍効果

体重約20~25gのICR系オスマウス(1群10匹)にザルコーマ180腫瘍細胞1×10⁶個/マウスを皮下移植した。移植24時間後に各1匹に記載した各試料20mg/kgを0.5%CMC生食液に懸濁して経口投与した。各試験例につき以後同量の各試料を10日間毎日投与した。ザルコーマ180移植後2日目マウスを殺し、腫瘍重量を測定し、0.5%CMC生食液のみ投与のコントロール群の腫瘍重量に対する割合を算出し腫瘍阻止率(%)とした。(表1)

表 1 抗腫瘍効果

試 料	総投与量 (mg/kg)	腫瘍重さ (g, 平均±SD)	阻止率 (%)
ビモラン	200	127±0.65	43.5
ジメチルビモラン	200	107±0.51	52.2
ジエチルビモラン	200	115±0.47	48.7
テトラメチルビモラン	200	108±0.49	51.8
テトラエチルビモラン	200	118±0.55	47.3
コントロール	0	224±0.89	-

急性毒性

ICR系マウス(体重20~25g)に対し、表2記載の各試料を経口投与し、Litchfield and Wilcoxonの方法によりLD₅₀を求めた。

表 2 急性毒性値

試 料	LD ₅₀ (mg/kg)	
	オス	メス
ビモラン	1200	1200
ジメチルビモラン	1600	>1600
ジエチルビモラン	1600	1600
テトラメチルビモラン	>1600	>1600
テトラエチルビモラン	1600	1600